## 庫全書

子部

欽定四庫全書子部


詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖服覆勘 總校官檢討臣何思釣

校對官編修臣 勵守旗 騰録監生臣 却敢修

欽定四庫全書 先醒齊廣筆記 ) 提要 7.1. 臣等謹案先醒齊廣筆記四卷明繆希雅撰 醫安道全以精於醫理故也是編初名先醒 希雍字仲醇常熟人明史方技傅附見李 珍傳中天啟中王紹凝作點將録以東林諸 分配水料傳 光醒在 廣筆記 百 八人姓名稱希雅為神

金克工厂厂厂 藥增至四百餘品又增入傷寒温病時疫治 齊筆記乃長與丁元為取布雅所用之方良 為一編希雅又增益羣方兼来本草常用之 法故曰廣筆記希雍與張介賓同時介家守 所得力朱國禎湧幢小品記天啟辛酉國祯 颇用寒凉亦岩易水河問各為門裡實各有 法度而希雍頗能變化介震尚温補而希雍 患腸病上下如分兩截中痛甚不能支布雍 促要



次三回車三百一人 敏之時時過從請增益奉方兼永本草常用之樂增至 游中多索此書者卒無以應予適旅泊金沙文學莊君 命之曰先醒齊筆記梓行於世板留嚴邑未便流通交 授受復多獲驗先是長興丁客部長孺手集子方一 樂道用存利濟隨所試效病家藏之好事者抄録轉相 然無功及物亦豈道人之懷乎於是萬輯醫方精求 既不事王侯獨全微尚幽棲自遂遠於塵累以保天 醒齊廣筆記自序 先醒衛廣筆記 <del>-1111</del>

四百餘品詳其修事又增入傷寒温病時疫治法要古 併屬其李君裝之鏤板流行傳之遠通庶窮鄉僻邑舟 有補於世也夫飲之曰善時天啓二年歲次壬戌仲 旅邸偶之明醫俾病者按方施治以寒疾苦則是書 既望東吳繆希雅自序 序 ている から 職者死中腑者成廢人中經絡者可調理而寒治之之 土地高寒風氣剛 化异类原心的 医线管部 电电影电影人 A CONTRACTOR OF THE STATE OF 後回のなるないからなりない。 先醒齊廣筆記 明 空虚之人猝為所中中 )毫釐謬以十里何者 繆希雅 採 

甚煎熬津液凝結為痰壅塞氣道不得通利熱極生風 濕熱之氣質多柔脆往往多熟多痰真陰既虧內熱 兩 邪之候也其藥以小續命湯桂枝麻黃生熟附子養獨 亦致猝然僵仆顏中風證或不省人事或言語審溢或 風氣既殊人之所禀亦異其地絕無剛猛之風而 浙七閩百粤两川滇南思方荆揚梁三州之域天地 防風白芷南星甘草之屬為本若大江已南之東西

金ケセルノー

道先以解散風邪為急次則補養氣血此真中外來風

或口乾古苦或大便閉滥小便短亦此其驗也劉河 2 2. Q . S. 7. 1.5. T 風燥之劑 虚者為多與外來風邪迥別法當清熱順氣開痰以故 火中痰中氣是也此即內虛暗風確係陰陽兩虚而 血原補人以持之設若誤用治真中風藥如前種 謂此證全是將息失宜水不制火丹溪所謂濕熱相 眼 次當治本陰虚則益血陽虚則補氣氣血兩虚則 歪斜或半身不遂其將發也外必先顯內熱之 候 則輕變為重重則必死禍福及掌不可不察 先雖齊廣筆記 冏 種

金定正是人 大棗 翦花懷生地當歸身白芍藥枸杞子麥門冬五味子牛 母白芥子竹瀝荆瀝枯婁仁次治本益陰則天門冬甘 婁根童便順氣則緊蘇子批把葉橘紅鬱金開痰則貝 也初清熱則天門冬麥門冬甘菊花白芍藥白茯苓枯 卯春正月三日子忽患口角歪斜右目及右耳根俱 頰 浮腫仲淳曰此內熱生風及痰也治痰先清火 乳白膠黃柏白蒺藜之屬補陽則人麥黄蓍鹿茸

真蘇子我廣桶紅錢括婁根錢貝母錢天門冬錢麥 五味子分白竊豈此乾節分十八日去連翹天麻乾葛 錢三 膠 てこう きょこう 白編其加蓮肉 清火先養陰最品燥劑 翘 初十加牛膝與黄柏武十三日去連翹加 我白芍藥或甘草分解沙寒我明天麻我甘南花我 四五錢飢時服日二劑初四至初九日加懷生地黄 錢河水二鍾半煎一 四 + 先醒齊廣筆記 鍾加竹涯童便各一杯霞 石斛 PF

金万里屋人 正 月 門冬或麥門冬我生地黄銀白芍藥纸牛 月 我月母 冬錢麥門冬我真蘇子五分 十二日定方 柏 廿二日定方 水三鍾煎一 五 分甘前花二致鮮沙寒或廣桶紅先五味 柏五鈴 我抬妻根我蓮 鍾 初 一飢時服 枯婁根錢五味子於鮮沙寒氣 日進二劑後每日一 肉 粒四 廣桶紅五 + 酸東仁鉄真蘇 劑 分白茯苓 五酒 錢蒸

これのでになる 胡 麻仁三郎即桑葉酒拌蒸何 銭四 牛 即浮去火 錢甘莉花二錢甘草一發酸聚仁錢生地黃錢白 參加石斛美至五月畫病始全愈前方中曾 二的甘菊花的懷生地的天門 凡 **拌人乳蒸凡三次蒸時類** 肋米泔浸洗净刮去皮拌 之上 膝茲蓮肉於十十日後去括婁根三月廿八 方 先醒新廣筆記 海烘 晒極 其里豆 其 我 冬茶二的 乾又至九 **氟方透** 蒸 中曾加 倍九 柏 两肠 劑 反参 蒸焙人 Đ

晒 加枸杞子 九 方先時合 炒晒法 許成 百日後伸 方易前 戟天以甘前 十打两容 九可 乳去 头菜 絲子木 服 潤枯 内粒 炒分遇者 焦作 烘及 山, 焦作 烘及 黄五 乾蒂 生 萷

加當歸到熟地黃鹿角膠柏子仁部的杜仲 白湯下忌食白菜菔牛肉牛乳 心飢時各一 スピリアとう 加甘前花於煉塞同蒺藜糊和九如格子大每六錢空 炭聚炒去甘前 各十二兩川續斷兩桶紅兩煉塞九格子大空心去蓝酒蒸川續斷十桶紅八煉塞九格子大空心 治右半身不遂紅 人參盖漆葉晒各一的 白茯苓澄白芍藥 服淡鹽湯吞 艳 先雅齊廣筆記 何首烏她黃着家天門冬以來 虚局 岩在左者屬血虚宜 火雨

金ケゼルノー 神 左右臂俱轉掉不便者亦用此方 火盛多痰肺經有熱者去人參加青萬子鱉甲各 王宇泰治臧位宇氣虚痰多脾胃有濕晚年半身不遂 日夜出火氣每空心臨即取半酒杯以竹歷黎汁各二 效 地的用長流水煎成膏再入鹿角膠的虎骨膠的霞 參的半 夏勉片 雅製 白术的牛膝的天門冬的懷 河問府來會加煉塞加各製膏和勻重湯麦 巷

去古未遠風氣猶厚形多壯偉氣尚敦應其藥大都為 立法造論後之明師如華代孫思邀華莫不宗之漢末 生之大病而藥不從時顧不殆哉仲景醫門之聖也其 杯人乳桑瀝各一杯和勻重湯賴熟調服 ペル) Dig Lis 1 寒 那即病而設况南北地殊厚薄不件故其意可即也 傷寒者大病也時者聖人所不能違者也以關乎死! 傷寒時地議弁六經治法 先醒新廣筆記

如是則法不終窮矣故作斯議備列其方稍為損益以 時而可改非違仲景也實師其意變而通之以從時也 矣 其法不可改也循至今時千有餘年風氣澆矣人物脆 凡外感必頭疼其疼也不問晝夜探其舌本必從喉嚨 從時地俾後之醫師知所適從庶幾患斯疾者可免於 枉阚 况在荆楊交廣梁益之地與北土全别故其藥則有 辨驗外感真偽法

金りせんノラモ

卷

骨痛脉雖浮洪而不數多不傳經煩躁脉數急者是欲 大いつらいかう 若此者皆非傷寒也 本不燥骨雖疼而頭不疼雖渴而不欲引飲至夜或偶 發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖氧而古 内 得銀過食不好亦不惡居處雖若匹怯而神氣安静 陽病 **乾出於外多兼煩躁不煩躁者即輕證也不頭疼而** 陽 其證發熟惡寒惡風頭痛項強腰脊強遍身 治法總要 先醒虧廣筆記

金グロアグラ 欲傳入陽明也若外證頭疼過身骨疼不解或帶口 杏仁九粒 傳經宜先發汗以解表都 鼻乾目疼不得即即係太陽陽明證養活湯中加石膏 汗本方加麻黄一錢生薑四片共前七片得汗勿再服 加紫蘇葱白如冬月天氣嚴寒感邪即病服此樂不得 三錢前胡二錢甘草八分萬根二錢生薑三片聚二枚 如病人自覺煩躁喜就清凉不喜就熟兼口渴是 研爛 水煎服秋深冬月應用此方亦可量去皮尖水煎服秋深冬月應用此方亦可量 其藥以羗活湯為主羗活 即 渴

急結者乃可下之桃仁承氣湯無蓄血證大承氣湯 次足四年公言 图 下者愈其外證不解者不可下當先解表表證罷少腹 枚生薑一片 太陽病不解熟結膀胱其人如狂血自 自汗不渴宜用桂枝八分芍藥二錢甘草一錢大棗二 冬六錢知母三錢竹葉一百二十片白芍藥二錢甘草 身骨疼不解者羗活一錢桂枝七分石膏一兩二錢麥 知母麥冬大劑與之得汗即解 如冬月即病太陽證惡寒畏風頭疼遍身骨疼 先醒麝廣筆記 如自汗煩躁頭疼遍

熱甚則譫語狂亂循衣摸床脉洪大而長宜急解其表 用 氣湯下之下後按其腹中不作痛而和病即已解如 自 Œ 邪結於裏大便閉小便短亦宜用調胃承氣湯或小承 人聲畏水聲畏火不惡寒反惡熟或先惡寒不久旋發 竹葉石膏湯大劑與之不嘔無汗與葛根湯亦須大 若表證已罷脉緩小便利是病解矣 陽陽明病正陽陽明者胃家實是也 汗潮熱口渴咽乾鼻乾嘔或乾嘔目的的不得眠畏 老 若表證罷後 其證不大便

ノシアンエ

とくこ

ガニ 急加茵陳為君主之 黃急用栀子麥冬淡豆豉大劑濃煎與之如已見身黃 用 數數與之 この日か シムラ 痛是燥糞未盡也再用前藥下之以腹中和二便通 刑芥二錢葛根三錢麥冬五錢牡丹皮一錢五分蒲 顕 錢茅根二兩側柏葉二錢生地黄三錢濃煎與之 眩欬而咽痛者用葛根甘草桔梗麥冬四味濃煎 陽明病不能食若其人本虚勿輕議下 陽明病無汗小便不利心中懊懷者當發 先班病廢等記 陽明病如血此緣失於發汗宜 陽 利 明

兼飲童便 潮熱手足減然汗出者此大便已輕也六七日已來宜 連 不鞭者慎勿輕下 下之用小承氣湯不行換大承氣湯勿大其劑若大便 承氣湯下之 下之用竹葉石膏湯加枯婁一 傷寒六七日日中不了了晴不和無表證大便 陽明病邪結於裏汗出身重短氣腹滿而喘 陽明病心下硬滿者此都未入於腹中慎 陽明病下之早外有熱手足溫不結 陽 明病發汗不解腹滿急者亟 個捣碎枯梗二錢黃 難

法通之 たにつうという 葉三大片蘆根三兩内無熱證者小便利口不渴此 宿食宜再用承氣湯下之 食穀欲唱屬陽明非少陽 竭大便雖硬不可攻之須俟其自大便用審導或膽導 也胸中煩熱者竹茹湯主之竹茹三錢麥冬五錢枇杷 育心中懊懷不能食但頭汗出栀子或湯主之 括婁黃連 病發潮熱大便鴻胸滿不去者與小柴胡湯去人參加 大下後六七日不大便煩不解腹滿痛本有 陽明病自汗出或發汗後小便利津液內 先醒虧廣筆記 陽 明

若 数者小承氣湯主之服藥後腹中轉氣者更與一服若 陽明虚也吳茱萸湯主之吳茱萸二錢人參三錢生蓝 者裹虚也為難治勿復議下 不轉氣者勿更與之若服藥後次日不大便脉反微濇 錢五分大棗三枚水煎日三服 外出胃中燥大便必輕輕則語語以小承氣湯下之 服譫語止者勿再服 血室汗止在頭用荆芥三錢萬根三錢黃芩 陽明譜語發潮熱脉滑而 陽明病下血語語者此 凡 陽明病多汗津

金ケセスクラ

巷

**痞者以黃連括婁湯調服之** 熱汗出惡熱身重若下之則胃中空虚容氣動膈心中 清穀者四逆湯主之附子乾薑甘草 者猪谷湯主之 童便對飲之 者白虎沩加人参主之 ここうました 錢五分麥冬五錢牡丹一錢五分生蒲黃二錢濃煎以 懊愧舌上有胎者栀子豉湯主之 陽明病脉浮紧咽燥口苦腹滿而喘發 先配齊廣等記 陽明病協熱下利者宜六一散心下 若脉浮發熱口渴小便不利 脉浮遲表熱裏寒下利 若渴欲飲水古燥 趺陽脉浮而濇

鄭聲鄭聲者重語也直視藏語鳴滿者死下利者亦死 为藥四兩枳實四兩大黃八兩厚朴三兩杏仁六兩塞 金罗巴及人言 岩 九如梧子大每用十九日三服 衣安採惕而不安微喘直視脉弦者生牆者死濫者 便数大便鞭其脾為約麻子仁九主之麻仁十二兩 吐若下後不解不大便五六日或至十餘日 潮熱不惡寒獨語如見思狀若劇者發則不 發汗多若重發其汗靈語脈短者死脈和者不死 陽 明實則嚴語虛則 識人循 E 晡 朴 陽

たらりいれている 少腹當硬滿小便自利下其血乃愈當用桃仁承氣湯 病 亟下之如便不結者大劑白虎湯淮之石膏四兩麥冬! 明 两知母一 協熱下利者宜六一散以黃連煎湯調服之 病發狂棄衣而走登高而歌此陽明實也以承氣湯 微者但發熱嚴語者大承氣湯下之利勿再服 又二陽并病太陽證罷潮熱汗出大便難嚴語者宜 明并病六七日表證仍在其人發在者以熟在下焦 兩五錢加大青一兩甘草七錢太陽陽明 先配新原筆記 太 陽 陽

驴 といしししいに 大承氣湯 陽病 其證 口苦咽乾脏往來寒熱腸満痛胸滿或

者肠下鞭涡乾嘔不能食往來寒熱未經吐下脉沉緊 三日 **痛耳擊脉法弦細** 汗則嚴語胃和者當自愈不和者則煩而悸 少陽脉小者欲已也 頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗 凡太 陽病不解傳入少陽 傷

草九分半夏一錢五分生薑九分大棗二枚水煎溫服

與小柴胡湯柴胡二錢四分人參九分黃苓九分甘

常承氣湯下之 若已吐下發汗温針嚴語柴胡湯證 たじのでから 以乾薑 取微汗愈 要實一枚 渴者去半夏加人祭括婁根 日三 藥三錢 若不渴外有微熱者去人參加桂一錢順勿 加减法 陽明少陽并病必下利脉滑而數有宿食也 若效者去人參大聚加五味子一錢少佐 若心下悸小便不利者去黄芩加茯苓二 若肠下痞鞭去大聚加牡 媽二錢半 若胸中煩而不嘔去半夏人參加括 先醒虧廣筆記 **若腹中痛者去黄芩加** 温覆 岩

當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也 如法三錢白芍藥二錢 罷 金タロルノー 躁者此為陽去入陰故也 尿白虎湯加百合主之 炙廿草一錢知母二錢竹葉五十片枯婁根二錢鱉甲 此為壞病知犯何逆以法治之 上但欲睡眠目合則汗藥用百合一兩麥門冬五錢 三陰治法總要 傷寒六七日無大熟其人煩 三陽合病腹消身重嚴語遺 傷寒三日三陽為盡三陰 三陽合病脉浮大見

47.E. O SE 2.1.5 竹葉石膏湯不渴或心下痞者宜黃連黄芩芍藥积殼 熱傳入於裏雖云陰分病屬於熱糞結宜下腹滿不可 而誤用芒硝以代真陰洞泄不已元氣將脫宜用人 麥冬括婁軍以清之 炙甘草以和之如便膿血即加滑石黃連佐以升麻乾 按宜下有燥糞協熱下利宜下腹痛下利宜芍藥黃芩 如邪雖入裏糞猶未結宜清其熟渴者用白虎湯 或邪未結於下焦少腹不坠痛 先醒齊廣筆記

陰病其證有二一者病發於三陽不時解表以致邪

岩 補 升 駯 葛根 柴胡之類 金ラロルノニ 即 白术炙甘草大聚氧薑芍藥大劑與之不止佐以升 元氣素虛之人或在極北高寒之地始有是證法宜温 從無陽邪表證從不頭疼發熱寒邪直中陰經此必 除各經見證悉從仲景傷寒論法治之如少陰咽痛 以平補之劑調之勿過用桂附以防其毒 以接其陽附子人祭乾薑官桂大劑與之陽四寒退 生瘡聲不出用苦酒湯到咽即效故知古人立法

Composed from 婁根耳雖熟盛去人參加麥冬知母括婁根渴亦加之 等證不可汗吐下宜和解小柴胡湯渴者去半夏加括 常也藥用年温佐以辛寒以解表邪太陽宜羗活湯陽 冬傷於寒至春變為温病大都頭疼發熱或渴或不渴 非令人可及也 明宜白虎湯無汗不唱者問用萬根湯少陽往來寒熱 陽遊俱然亦問有先微寒後即發熟者大抵發熟其 春温夏热病大法 先雅齊廣筆記

至夏變為熱病其表證大約與春溫同但熱比於温則 坚痛始用大承氣湯下之 察邪結中焦小承氣湯調胃承氣下之邪結下焦少腹 邪氣更烈耳解表用白虎湯竹葉石膏湯有太陽證則 加羗活有少陽強則加柴胡黃本如發斑白虎湯竹葉 傷寒温疫其不可治及難治者皆屬下元虚 石膏湯加玄參梔子桔梗鼠粘連翹大青小青青黛大 **剩與之二證若大便秘宜按之其邪已結於內便製宜** 

之過也 とこのうとう 者 大腸與肺為表裏同開竅於鼻足陽明經屬胃與脾為 近代醫師鹵养既不明傷寒治法又不識雜證類傷寒 表裏同開竅於口凡邪氣之入必從口鼻故兼陽明證 邪在三陽法宜速逐遅則胃爛發斑或傳入於裏則屬 陰邪熱熾者令陰水枯竭於法不治矣此治之後時 獨多 先旺虧廣筆記

傷寒温疫三陽證中往往多帶陽明者以手陽明經屬

當試也 史鶴亭太史丁亥春患瘟疫頭痛身熟口渴吐白沫書 往往安投汗下之藥以致虚人元氣變證叢生元氣本 金ラモアノニモ 夜不休籃師誤謂太史初罷官歸安投解鬱行氣藥不 苦寒的水酒各一碗煎八分重者水醋各半服之 虚之人未有不因之而斃者矣戒之哉汗下之藥馬可 而愈不論傷寒久近立效本草云天行尤良 時氣傷寒 除陰症不可服

たこの見から 時大便尚未通太史問故仲淳曰昨汗如雨邪盡矣第 豆豉約二合麥門冬两妇母数石膏两一剩大汗而解 效又投以四物湯益甚諸監謝去謂公必死遣使迎仲 食甘蔗二三株兼多飲麥門冬湯不三日去燥糞六十 **从病津液未回故大便不通此腸胃燥非有邪也令日** 不下使熱邪彌留腸胃間幸元氣未盡故不死亟索淡 疫者非時不正傷寒之謂發于春故謂瘟疫不解表又 淳至病二十餘日矣家人具以前方告仲淳曰誤也瘟 妙 先醒虧廣筆記

陽明證也曰然問所投藥曰葛根湯仲淳曰非也曰葛 乾燥不得眠診其脉洪大而實仲淳故問鑒師監 章衛陽銓部患熱病病在陽明頭痛壯熱渴甚且唱鼻 金ダロルノー 根湯非陽明經樂子曰陽明之樂表剩有二一為葛根 餘塊而愈 知母甘草加麥門冬竹葉名竹葉石膏湯石膏平能解 湯 明之氣逆升也萬根升散故用之不宜白虎湯硬石膏 為白虎湯不嘔吐而解表用葛根湯今吐甚是陽 巷 師 日

たいり … という 宜又疑其不用甘草何也曰嘔家忌甘仲景法也 去獨曰斯時投藥五鼓蹇天明投藥朝食蹇已而果然 家血家是也病人渴甚而嘔是陽明熱邪熾盛刼其津 或謂唱甚不用半夏何也仲淳曰半夏有三禁渴家汗 曰王翦取荆非六十萬人 不可 李信二十萬足 実臨別 液故渴邪火上升故嘔半夏辛苦温而帰有毒定非所 解兵遂用大劑竹葉石膏湯疏方與之且戒其仲君 先醌麝廣筆記

肌鎮墜能下胃家痰熱肌解熱散則不唱而煩躁此熱

金りて 乞方仲淳問口汝父當時曾頭疼身熟乎曰然曰曾服 高存之隣人賣腐者傷寒發喊兩日夜不省人事其子 出第其人年老多作勞故于白虎湯加人參進二劑立 僅載白虎湯一方仲淳思之曰傷寒頭痛身熱口渴本 之其方類用氧薑柿蒂丁香及附子等温熱之藥末係 汗藥乎曰未也曾吐下乎曰未也仲淳因索傷寒書檢 陽明熱邪傳裏故身凉發喊未經汗吐下邪何從而

上ノー

ここうこここ 能殺人也其人即置方不取遂以禪禮雄鼠糞麥冬韭 人少年問日若曾病此乎曰然曰愈幾日而妻病曰八 十五兩五錢病寥越六日產一女母子並無恙 者不得即以井底泥塗臍上乾則易之一日夜盡石膏 上黑胎有刺勢甚危仲淳投竹葉石膏湯索白藥子鹽 九日曰曾有房怨否曰無之仲淳故曰若有房慾此方 存之一家人婦傷寒米乞方仲淳已疏方與之矣見其 于潤父夫人城九月患傷寒陽明證頭疼此熱渴甚古 先醒虧廣筆記

金灰匹尼全言 黄之半二劑便通熱立解遂愈 投参少許仲淳叱曰参一片入口死矣亟以大黄 姚平子傷寒頭疼身熟舌上胎胸膈飽悶三四日熱不 張太學城浦內人患熟入血室發狂欲殺人白下醫以 萋~連子切片黃連枳實下之主人驚疑不得已减大 解查奄氣似不獨者一監以其體素弱病久虚甚意欲 白柴胡二劑勢定更用竹皮湯二三劑全愈 寒治之煎藥未服陳錫玄邀仲淳往診仲淳云不可 卷一

立姓或問仲 淳治傷寒有秘法乎仲淳云熟讀仲景書 Calqual Air 四明虞吉卿因三十外出疹不忌猪肉兼之好飲作 諸昆仲環視揮涕羣醫束手仲淳以大劑白虎湯 樂遂定 服其藥投一 **翁文學具次感冒壯熱舌生黑胎煩渴勢甚劇時待熟** 載失忽患傷寒頭痛如裂滿面發赤古生黑胎 松法也白虎湯中曾加人参三錢 剩而安先與童便繼與京血行血安心神 先醒虧廣筆記 煩 劑 踩 泄

親送至鄞耳余聞其語為之惻然急往診其脉洪大而 **敛之向余曰此兄不禄仰韶必繼之即不死八十二老** 郎 度其尊人虞仰部年八十二矣客寓莊斂之處方得長 兩 口渴時發聽語兩眼不合者七日洞泄如注較前益 挾重貨而聽其扶襯東歸余心安乎萬一有此惟有 病初不减此兄素不謹良一友疑其虚也云宜用肉 為疏竹葉石膏湯方因其有腹渴之病石膏止用一 內問懷抱甚惡膝下止此一子坐待其難腸為寸裂

金ケゼ

たと言

無

脉似非此證豈不數日脉頃變耶復往視其脉仍洪大 病 日熱邪作崇此客病也不治立殆渠 泄瀉已八年非暴 前方但加石膏至二兩飲之口得母與泄瀉有妨乎余 而数余曰此時一 霍然但瀉未止耳余為疏脾肾雙補九方更加黃連乾 劑夜即遂安即省人事再劑而前惡證順去不數劑 附子敛之以其言來告余曰誠有是理但余前者按 也治病須先太甚急治其邪徐并其夙悉除之急進 投桂附即發在登屋必不採矣一 先醒齊府筆記 主 耜、

金好四库全言 葛升麻以痧痢法治之不一月寫竟止八載沉疴霍然 骨内疼痛下元尤甚狀如刀割不可堪忍口渴甚大便 告余賜也 日解 告為疏一方乾葛錢石膏 莊欽之一庄僕因受寒發熱頭痛如裂兩目俱痛渾身 失仰部耄矣别余歸老拜謝垂涕謂父子得以 二 銭 次胸膈飽脹不得眠己待斃矣斂之以其證來 子打碎連 巷 半 柯 麥門冬銀知母半錢 Б

體疼痛尤甚以養活去太陽之邪石膏竹葉乾葛知母 たっつうとう 常熟吳見吳在京即時有小青衣患傷寒愈而復復而 葉以代仲景諸血證樂遂愈 故遂愈 麥門冬解陽明之熱括婁枳殼枯梗疏利胸膈之留 奴傷寒熟解後復下血不止主人以痢藥投之更甚 淳云此傷寒失汗之餘症也用地榆麥門冬知母竹 光雅齊廣筆記 主 那

煎

服四剩而平此太陽陽明病也貧人素多作勞故下

金少口 能救他人亦不肯往仲淳亚馳診之病人面色黄白六 愈愈而再復不知其幾趙文肅公謂仲淳曰此非 莊斂之一 危急余為疏方山桅仁銀枳實具豆敢一 不大便者久病津液枯氣弱不能送也投以人參鈺麥 合壞證之餘邪且退矣胸中不快虚而氣壅非實邪也 冬許枳殼炒 微弱大便不通胸中不快亦不思食曰此為傷寒百 僕因傷寒後勞復發熱頭痛腹內作瀉勢甚 盡劑立解而蹇 川黄連 兄 不

たとうないという 甘草我枯婁根二 我乾萬一致桑白皮或桔梗鱼白芍 門冬錢民甘草氨紫蘇二發北細草於前胡二分次日 梁谿一 頭痛止熱未退口渴仲淳用芍藥五味子人曰風邪未 門冬我不數劑而愈 思飲食為去山桅积實黃連加點甲與炙甘草二致麥 葛錢調六一散五錢服二劑熱退瀉止頭痛亦愈但不 退遽用酸斂何也曰因人而施爾一 男子素虚春中感冒頭痛肌痛發熱羗活氨麥 4 先醒虧质筆記 杯即愈麥門冬至 Ī

樂 金りて 甘 待用潤字號九藥數錢下之去黑囊無等勢遂定在在 從祖近湖公少年因房勞食犬肉傷寒諸監以其虚也 補兼施至發狂登屋奔走時號日夜合肚夫看守者 前花無石菖蒲品鐵柴胡六括婁根無見母去心前 息隣於死矣徐以參膏灌之至百二十日全瘳 月餘急走使延朱遠齊遠齊先命煎人参青二角以 我五味子五 治 たノー 傷風後耳聲 仲淳定

欠り ラーショ 脉無倫次問其所服何藥云石膏湯予云病證固重 兆恐難挽回别去三日大雨中復來邀看則神氣已脫 其形神謂云翁病屬外邪非勞發也須着意珍重時葛 趙和齊年六十患外感予以他事請見延至中堂云偶 因勞倦體疲正欲求教予為之診視細按其六部并察 胡九甘草八北細年如蘇梗是桑白皮品鐵加竹歷 杯 誠在坐予私謂云此病是極重外感邪氣有內陷之 不拘時服 先雖齊廣等記

咳氣逆惡露絕不至勢甚急迫予謂此症俱係外來客 經發汗邪氣傳裏裏虚水涸不勝邪熱真氣已脫必不 藥又差無汗發熱非陽明症何得用石膏此太陽症未 便霍然先是有用白水歸芳等補藥幾為所惧二條 邪尚屬可救設正氣虚脫現諸症者必無幸矣何以見 魏孝嘗室産後飲食不節復感風寒遂致發熱諺語喘 からして たくこを 可救時猶以予言為安不兩日而斃矣 以脈氣浮大有力故也用大劑疏風消食之樂二劑

高存之次即童時夏月身熱十晝夜止飲白湯諸醫 之不解以麻仁凡下之熱如故惶急中仲淳忽至診曰 參兵兼健脾清暑導滯之劑未幾症作如方飲之處止 此傷暑也白虎湯是其本方因誤汗下虛基加人參 劑微汗腹眩少頃熱解又疏一方防其瘧痢仍用 暑 又作存之不得已于生脉散中加益元散飲之兒匹 治傷暑 先其齊廣筆記 孟

且新兒旦夕虞不保兄言何易也仲淳曰視兒目光炯 自松陵來存之語之故仲淳曰生脈益元散得之矣不 **說甚諸監曰數日後死矣舉家惶急禳禱紛紜仲淳復 佬順三日不敢與藥目騎脣頭古乾謀之仲淳口此暑** 臧玉涵子歲半盛夏咳嗽七日 因浴受驚又傷食大熱 **轸而諦視兒問糜甘否曰甘大呼曰病去矣存之且喜** 病也當與白虎湯玉涵曰腹瀉石膏無害乎曰先以天 炯且飲食味甘是精神已王胃氣轉矣奔果脱然起

金好四母全書

白虎湯加人祭因兒患肺熱且止仲淳再於之口暑邪 熱又以天水散二錢不效仲淳曰其為暑症無疑當以 正氣不足勝邪也偶思刺瘧論有云凡瘧先時一食頃 服二剩不效鼻露眼開口不納氣勢甚危叩仲淳曰此 1) a. 10 ..... 1.1.10 之脈無刺漉漉之汗意者服藥不得時即將前藥并劑 客於皮膚分內有熱無寒是為癉瘧斷當用白虎湯連 水散探之服二錢少項藥夾痰而吐微汗身凉黃昏復 可治過時則失之也又云無剌熇熇之熱無剌渾 先醒虧廣筆記 Ī

金好四层全百 煎露一宿鷄鳴温服之病頓失更不須調理精神渐 均失之也 費及時當早服晚投當晚服早投當熱而溫當溫而熱 經年無病以此知仲淳察病望氣靈心慧眼又知服藥 口乾日飲冷水斗餘渴循未解自分必死莊飲之憐其 準提咒三千念佛號三萬忽患頭痛如斧劈身熱發躁 天下偶客金壇寓西禪寺僧舍酷暑中坐卧小樓日 邱裴在問棄家逃禪持戒如素遍遊五岳足跡幾滿 此玉涵自定案 復

たこうえんう **斂之命余僕克動相追歸視其脉知係受暑為疏竹葉** 畫玩器盡授斂之泣而言曰兄其為我收藏吾死後切 石膏湯方斂之如方製藥躬為煎服不二劑發熱口渴 之耳斂之涕泗填胸束手無策余時将遊梁谿陽美間 旅病時過視疾一日急走倉頭召斂之永訣以所攜書 勿用世俗禮葬我惟以兩缸威吾尸其中以三尺地埋 止幾十剩病始退旋加健脾藥十餘帖而安 傷暑霍亂神方 先醒齊廣筆記 包瑞溪學憲傳仲淳累驗 Ī

高存之家僕婦患此仲淳以砂仁 服 終瓜葉片白霜梅內以并核中仁同研極爛新汲水調 金りせんべき 取稀豆葉搗汁 用粟米 入口立瘥 又方 叉方 ス 方 連殼捣碎煎湯溫服下口立愈屢試神效 梁谿顧聖符傳 馬銘勒傳 硫飲之立愈 炒 研雨 鹽 撮沸 湯調冷

からうるんな 起 取 **抗地深尺餘取黄土以新汲水調化飲一二甌立愈** 定服一劑愈傷冷物者加吳茱萸鄉 用青萬嫩葉手孫如豆大井水吞下數枚立愈 田中泥聚塗臍上令此者獨其上并獨口中得照立 叉方 治中暑昏脏煩悶欲死 叉方 光醌斯廣筆記 六

麥門冬姓 煎 即愈 用田螺三枚捣爛入青鹽三分攤成膏貼在臍下 瘧 分不拘時服 如發熱口渴先服此方一 治中暑大小便不通 治熱多作吐頭痛口渴無汗或汗少 知母 錢塞 五分二 硬石膏研 二劑 銀竹葉二十梗米

如吐嘔而寒甚者此方去柴胡當歸加人參與半夏蓝 熱者第二方加黄茶質 二方去當歸加白荳蔻末分 錢 錢硬石膏不與四人 白茯苓具橘紅馬山查肉我竹如或知母蜜炙麥門冬 蓝一 銀柴胡五分當歸廣皮吳茱萸白术三錢 治寒多熱少無汗 如寫去當歸加茯苓爲 先程新廣筆記 如汗多加白芍藥三线黃者 如寒熱相半及先寒後 如有食脾胃不健第 二十九

金定四库全言 剩方可換健脾胃藥或兼用健脾胃藥如白茯苓白水 窓末か神妙り 廣陳皮白芍藥人參白 荳蔻山查等劑是也 三錢去柴胡 者前方中去白水乾薑加點甲酯炎研 夏當用第一方加天花粉等倍用麥門冬知母須三四 用第二方加人參與生薑五 如傷食必惡食第二方加山查與白荳 厚朴黃汁 妙 如寒熱俱甚久不 如 渴甚者不可用 極 地骨皮多麥 如寒甚 半

參 羌治太二 12.19 St 1.15 加麥門冬知母竹葉白水 惡寒加薑皮甚則加桂枝 人参白虎湯中加桂枝素有血證及咳嗽者勿用參 兼 太陽經瘧頭痛遍身骨痛項脊覺強主方如渴則 治秋深寒熱甚而汗多者 陽主縣前胡五分猪冷錢澤寫鉄錢此係前胡一錢猪冷一澤寫炒 陽明矣 先醒衛廣軍記 渴則加乾葛 **从病用黄耆** 陳皮美 虚甚か 투 渴甚汗 桂

兼前症此 金タセ 砚 初 至 兼 錢三 錢三 橘 發 石膏 惡寒甚指八色點本方加桂 紅錢竹瀝 汗多本方去乾葛加人寒虚無之 汗未大透本方加乾葛 б 沜 陽 とノニーを 片 加 明 細麥門冬各五錢 粳米 太 經瘧熱甚渴甚煩躁惡人聲惡心不眠主方 陽陽明也本方加羌活錢 撮水三大碗煎 杯 如嘔本方去竹葉換竹茹覓桶 卷 錢加 至 枝 知 碗 毌 痰多本方加枯婁 五 分錢 錢去 不拘時服 加皮 至蜜 頯 如 白术 頭 痛骨痛 炙 在 Ē 秋末冬 兩 錢三 如瘧 竹 葉 如 紅

欠こり三·A1与半杯湯而便 錢二 白苴蔻仁 麥門冬在鱉甲至一兩廣橋紅人參素有肺 至 杺 三 乗熱服 勿 肺 疾兼除寒熱瘧邪藥一劑方具於後 又兼惡寒加桂枝貨每日下午别服開 火咳 錢 涡 如虚寒胃弱 用 蓝 至四 便 爆者 七分 如熱甚而嘔加水瓜 加至八錢水三種煎一 分加 匙 白茯苓雞鳥梅肉 加 有 堊 痰有濕因而唱者加半夏 先雅齊廣筆記 錢三 机 松白术 把葉三大 鍾 研入白茧 胃健脾消 Ē 火加 沜 錢錢 楼湯 者至 竹 鈛 五 用錢

橘 膝桶紅各五錢 錢至 金りせんノー 紅如故 柴胡湯柴胡黄芩半夏甘草人参 如有肺火本方去人參半夏加麥門冬年牛膝鱉甲 脇痛主方 少陽經雅往來寒熱相等口苦而嘔或魚耳雖舒 一大 兼陽明渴欲引飲此少陽陽明也本方去半 如爪點便燥及痰盛方中去半夏加當歸 惡寒甚本方如桂枝一錢至生薑皮 如惡食本方加枳實炒 常申三致至 白荳蔻好

SCHOOL STATE 消痰兼除寒熱瘧邪藥如前方 心飢時各一服再煎五六分下午別服開胃健脾消食 桂枝錢人參錢白芍藥三銭萬皮銭水二種煎一 健脾消食消痰兼除寒熱瘧邪等藥如前方 主方 少陰經瘧惡寒心煩而渴小便艱溢無汗躁欲去 太陰脾瘧寒從中起寒甚而後熱嘔甚嘔已乃衰 先配衛廣筆記 Ē 一鍾空

夏加石膏以麥門冬兹竹葉片+每日下午別服開胃

桂 参薑皮 金牙巴压气量 錢至 午别 我白茯苓或猪苓 甲牛 水二鍾煎八分空腹飢時各一 厥 衣或手足冷或欲飲水或咽痛主 鈍鈍 膝各三銭 陰經應色養養然善太息不樂主方 服問胃健脾消食消痰除寒熱藥大暑如前方 至 如熱甚倍鱉甲牛膝加烏梅肉有痰加竹 柴 胡 知母五銭至桂枝 我 数甲四錢至 鉄澤寫一人冬三我有 服 當歸五 錢錢 方 至 如寒甚倍 細草五 肺 錢銭 薑皮 坔 橘

成露一 飢時服 母 及内熱去桂枝加 别 硬 石膏錢知母蟲麥門冬五錢竹葉 服開胃健脾消食消痰除熱藥如前方 **越廣陳皮與發日加人參加** 錢錢 治陽分間日瘧寒熱俱甚煩躁舌胎 一宿五更 至 牛膝二錢至何首烏茲水三碗煎一 便燥及昏暈欲死本方加麥門冬竹瀝下 服 知母 先星到廣筆地 錢三 者錢 勿有 用蓝皮鱼隔夜煎 百 枯婁根六 如有肺 圭 一碗空 貝

**道皮纸炙甘草如何首鳥與水二種煎八分露一宿天** 金次口屋全意 差 野 温服 活二錢頭不乾萬五分陳皮錢麥門冬銀知母我生 علد 筋骨痛屑燥口乾惡心無汗後半夜凉天明頭痛 治隔一日一發先熱後寒熱少寒多午時發頭疼 治胎前雅熱多口渴方 我柴胡我硬石膏五錢至麥門冬五一西 知

發日五更溫服浑再煎六分并進 アニタニ から 分五更温服再煎五六分并進寒甚者陽氣虚而下陷 人奏生薑皮各五錢廣桶紅去白二錢河水二碗煎 方加生薑皮四錢至白木錢 一益陽氣則寒自止邪自散矣故應多服人參如汗多 育 **錢至四五以及客見忌以** 治胎前瘧寒甚不渴少汗方 胃虚加人参三五錢河水二碗煎八分飢時服 錢廣橘紅二錢至白茯苓或竹葉五十 先醒府廣筆記 如熱甚寒亦甚本

并加黄耆 金ケセルノー 有肺 皮 去 貝 生 毋 乾 紅錢生薑皮二 宿五更温 熱者去人参加白芍藥 蓝 盐 錢四 Ð. 治産後瘧主方 錢錢 如 至柴胡錢數甲 發五 六 如 脾 渴甚更加知母 服 胃弱加人参二我 三一 鉄銭 至 如 乾薑炒黑 渴加麥門冬我竹葉五十 七四 錢錢 錢括婁根至 至 四 至 z 如 分外水二 膝一白茯苓 汗多加黄着 元氣虚亦如之 一種煎八 痰多并 五

亦 たこうらいう 答 熱多加青蒿三四錢 錢五 P 如之并加益母草我黑豆炒 治三日雅寒熱俱甚或早晏不齊作止不 治三日瘧寒多 寒甚加桂枝生分至 錢酒 牛 一三 兩錢 至 五分桂枝五分乾薑或廣陳皮益何首烏班 膝 N 何首鳥 先星齊廣筆記 廣橘紅 乾薑炒 蘇木五錢打碎 麥門冬發 五知 如惡露未 圭 煎別 毋 どく 片 净

水三種煎 我內 並勉 线五 E 金りで 分五 空心飢時服 桂 氣虚加人參五 枝五分道皮三錢無馬梅人乾萬五之我 如泄去石膏知母竹葉倍白水加茯苓與車前子 治三日瘧熱多渴甚 不 思食及食難化加人參疑白荳蔻仁好厚朴 我澤寫 鍾露一 如渴加石膏品竹葉五 錢一 宿發日五更溫服查再煎七分 如汗多加黄者為兼便燥加歸 痰多加竹瀝一大 ተ 杯 渴止去之 無汗 汗多 倍或

次につきんだ 錢橘紅錢石膏八錢加竹葉三十片水三大碗煎 健脾消食消痰藥如前法 便燥加當歸 多白术氣虚倍加人參 如嘔本方加竹茹烏梅 宿發日五更溫服 治三日瘧寒多熱少汗少或無汗 無汗或有汗而少加乾葛姆 得汗渴止去石膏乹葛下午別服開胃 何首鳥 先醒齊廣筆記 麥門冬至兩二錢加 如惡食加青皮醋炒一白荳 汗多本方加 知母 孟

服渣再煎七分連進不拘時空心飢時服 兩至 ノシーハレ 人 つっし 水三鍾煎一 首烏一牛膝一當歸五錢便帰用 治三日雅陰分黄氏姑服之立起 白荳蔻仁分水三碗煎一 治三日瘧 兩生薑皮錢水二鍾煎八分空心服 白水各五錢桶紅 鍾空心服立愈虚極者加人 錢錢 一碗露一 至 桂枝二錢至 整甲品及廣橋 宿發日五更溫 **豊皮** 红

服参者加参 **然甲錢廣陳皮去 薑皮加寒水石錢滑石與** 銭 たこうここと 錢 瘧初服此不效仲淳堅持此方加參至平生薑皮 一服即起 如惡寒寒熱交作加柴胡銳生薑皮針 治瘧邪未盡而痢作者先服此方二三劑 服 方服之滞 錢三 銀白茯苓錢柴胡銀白芍藥銭乾葛 下必 先程以,廣筆記 غد 如無汗加乾萬三致 主 如渴 錢至 两至

出出 乾萬二致升麻醋 金好四庭全章 凡 飛過滑石末鄉兼吞滯下九二三服送以萬根湯 子湯亦佳 鈛 治久瘧不己似勞 便酒 **光五錢** 五炒 錢三 燥者用 白稨豆數二點甲 小川黄連江 如 外蓮肉去 膝 腹痛以炒砂仁三四錢濃湯吞滯 酒 至炒 三二 誸 一錢 河水二 线二 白 炒炙甘草母鳥梅肉 茯苓或白芍藥 何首鳥白林 建半煎八分 錢鮮 Ξ 錢炒 調

茯苓八藿香葉四白直蔻仁五錢為細末米粉糊加蓝 先煎露|宿臨服時再重湯頓温 蓋瘧者暑氣為病 錢水三鍾煎一鍾加竹瀝一大杯發日五更時服隔夜 何首烏十二真茅山蒼术內半夏兩桶紅內人參四 也暑得露即解世鮮知者 錢生萬皮五分柴胡無汗者用有汗則去之 貝母三生萬皮二錢柴胡一錢五分已上二味熱多貝母 九如該豆大每五錢下午及臨即白湯吞 防瘧方夏秋不報必無瘧矣 先配齊廣筆記 美 白

虚者益血又分臟腑經絡各從其類以施向導即經年 不愈者竟霍然起失 消息散邪之外專養胃氣痰多者消痰氣虚者補氣血 回夏傷於暑秋必疾症遂從暑治不旬日 珍後数以意 終無抹於病偏檢方書通知雅之為病暑那所致也 死矣先生何方立止之仲淳曰何言之易也疏三方作 沈少卿中丞請告時苦雅仲淳往診之憊甚曰再 淳年十七時為瘧所苦凡湯液九飲巫祝靡不備當 經

金ラセムノー

劑而效 大きりきんこう 国 劑 顧伯欽患瘧仲淳之門人疏方以白虎湯加人參一 最後一劑人參一生薑皮而水煎露一宿五更溫服盡 五劑 用橘紅白豆蔻白术茯苓殼蘗烏梅白藊豆山查麥芽 石膏湯加桂枝以其渴而多汗也次二劑健脾去積滯 而瘧不止體匹弱仲淳至笑曰此虚甚非參不可 庸工云豈有用參至兩數者乎改用清脾飲二十 日夜飲盡次早產止先二劑清暑用大劑竹葉 先輕衛廣筆記 疌 兩

脉 膏纸 莊斂之妄患瘧寒少熟甚汗少頭痛不皆飲食余為 金ケビという 甚危急做之過余云恐是虚弱前方石膏知母竹葉 三劑不應忽一日几寒熱者再昏迷沉困不省人事 不認也投以大劑祭民一劑而蹇 洪數而實用麥門冬銀知母五分石膏五銭竹葉 粳米損桶紅錢牛膝一乾葛 負衣養養白編豆 雨黄芪 寒兒母母 發陳度鏡乾葛進甘草分石 銭三

如此者四日矣日漸增劇陡發寒熱如瘧狀寒少熱多 喉 莊 <u>衆煎好勿輕與服待按脉加斟酌馬次早往視其脉</u> 錢已別矣余追想前脉的非屬虛急令人往視令其將 Calon Lin 近寒凉非其治也余亦心疑為去石膏等而加人参二 何首烏五錢令其日進二劑瘧遂止 放之前患症妄越一載忽頭痛如裂心內雜亂不清 作 如初急止人參勿服惟仍用前方而加石膏至二兩 痛失音古破咳嗽有痰胸膈飽脹惡心不思飲食 先醒齊廣筆記 四十

金ケセピノット 括妻根錢河水煎服三四劑心內清頭疼喉漏失音舌 加 脚氣狀斂之疑為傷寒余曰此受暑之證即前年所患 無力不减余為去石膏知母竹葉鱉甲貝母括婁根而 飽脹寒熱俱愈但惡心不思食如故而心口痛下 而勢加劇耳法當先去其標令以石膏和麥門冬五 後頻出汗方解平時有心口痛 胡索是五靈脂外生消黃人 題橘紅二 錢 牛膝我驚甲毀竹葉一 一分薏苡仁致木瓜 證并作下元無力如 百 五 片 貝母

らんののでいたよう 此必瘧時不遇明眼人妄投半夏故也投以大劑麥門 高存之甥女嫁後患胎瘧人不止仲淳云病在陰分以 章衡陽子室患瘧後失音寒熱愈甚告急仲淳仲淳云 草如幾十劑而愈 人参致牛膝一兼健脾清暑一到而止 石斛銀白編豆銀白芍藥銀竹如此桃把葉片大炙甘 治停食發瘧 白茯苓 炙甘草 先醒齊廣筆記 野甲 知 毋 貝母數劑源 7

金りせ 用 視之命仰卧以指按至心口下偏右大叫因詢得其由 錢其病如失再以人參致麥門冬我橘紅錢白芍藥是 藥不受小便一滴如赤茶大便閉諸醫束手仲淳忽至 水煎服四日 食不下咽已而水飲亦不下白湯過喉間嘔出作碧色 九藥一 鐵九藥用裝紅和平胃散作末聚內和九白湯下 溪王興甫偶食牛內覺不快後遂發瘧飲食漸減至 服至喉輒不嘔水道漸通次日下黑物數塊 起 巷

屋ノニー

たれりゃこれる 梧子大貯磁器中封固如胃弱以連子四十 闕 闕 痢 醋煮稀糯糊和九如梧子大每四錢空心淡鹽湯 川黄連真藍汁 滞下如金九 闞 珍此肉桂 蟲 **た** 細煅 滯下俗呼痢疾 存 不浸 六去 两性 拘隅 錢乾漆如 先醒齊廣筆記 舶土 半研 極 两如 法 細末薑汁和 飛 烟 紅五十 五存錢両 性 射 鈓 水跌九如 粒 研 1 為 橘 一晒 兩氧 極 红 錢二 細

當 生ラロルノー 湯中吞藥 裹急用當歸等加入如前方 参致升麻 杳 以九藥四錢為率 銭二升 我黄檗 升麻酯 銭木香汁匙調 麻船炒煎湯吞四錢 便赤监短少或不利加滑石末與調入各症 赤多加烏梅肉姓山查肉 七階 か煎湯春四銭 裏急甚以白芍藥寒炙甘草 分煎湯吞四錢已後各條加減 D 渴及發熱 調滑石末銭去 白多加吳菜 後重甚加續 腹 痛以白芍藥銭炙 紅麯 , 與湯泡 柳 錢二 分錢 鈛

これ」口らいたか 多噉能食之人慎勿輕用大黄巴豆牽牛甘遂大戟等 綠色升麻門炒可用至白稿豆銭 白芍藥酒炒 黄芩鸡炒一 白稿苴以去裁灸甘草或橘紅或白芍藥酒炒白茯苓 細末煉塞九如格子大每服三錢米湯下若積滯 加滑石末錢每服四錢白湯吞 **参橘紅炒砂仁湯吞三錢** 不止加內並懲軍內去心炒砂仁五分 人參矣 惡心欲吐即噤口痢多加人参石蓮 先醒婚廣筆記 凡治滞下非元氣壯實 水寫無積滯者用 100

黄芩黄連白芍藥炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮內炒各用 等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人参白芍藥當歸 久之自愈血虚可加阿膠二致給 紅麴升麻鄉益母草加炙甘草一倍滑石末四五錢足 **升脉未滿七月勿用滑石證急者必須用之不拘此例** 若惡露未盡兼用乳香没藥五生分 該心奪命丹治虚的人患痢及痢人脾胃虚 **儿產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃** 凡胎前滯下宜 炒砂仁末 者 用

細末煉蜜九如菜豆大每服三錢白湯吞 并虚弱人即以前方中去豆蔻另用人參三錢煎濃湯 的豆蔻1两白芍藥六两炙甘草而廣橘紅三白藊豆 川黃連切片拌好酒同英茶英浸二宿瓦上炒乾 "滑石六赤麵炒研運內去 加味滞下几 视花八 先醒衛府筆記 痢用濕 白芍藥酒 五心两炒 焦緑色升麻醋 浸切片 如県口痢 四十四

每五錢白湯吞飢時服證重者日三服 茱萸白藊豆陳皮各三兩治白痢作四樣一無木香一 糊成九如亲豆大每服三四錢烏梅湯吞 滑石水飛 **錢** 焐 白編豆炒去 紅翅飯 一動 滑石木的檳榔四炙甘草雨木香和水 积殿两 白芍藥酒 如炙甘草和升麻炒 两净炒 **ゅ細末荷葉湯稍加薑** 乾萬 為細末塞九 色者 Ξ 两 輎 蓮 岩加吳 肉 炒去 如心

白芍 勿用檳榔枳殼 痢加肉豆蔻 榔 無檳榔枳殼一加當歸一加吳茱萸白為豆橘紅去檳 急色赤者用當歸惟惡心嘔吐及不思食者勿用 枳殼 治血痢痛甚湯液學憲武 五錢炒 仲浮加入者尽般視花五錢炒五錢此一只是視花同妙去 燥熱煩渴惡心者勿用水香 滑石末錢乳香 積滯多而後重者用檳榔枳殼 先是不廣筆記 之神效 没藥五差 山查肉 溪 元氣虚弱者 骂 分炒 真

錢甘草分 金戶四庫全書 囱 飲之蜜和為九更妙每四錢一 緑色升麻 頭人 川黄連魏在炒 故内且竟分炙甘草加山查肉錢綠升麻酯炒 治人痢紅中東有青色白痰間發熱 治噤痢神效 分錢 参錢蓮肉去心炒 調服 白芍藥二致廣陳皮錢人 服白湯吞 **枚焦** 水 鍾煎坐 砂

為九如恭且大白菜菔湯吞三錢重者五錢以行兩三 次腹中爽快為度胃氣虛極之人勿輕用之積滯重而 參冊川黃連蓝計製石蓮子五錢 水二種煎八分 為木一兩 枳殼两 細末煉蜜同水煎木香和捣切片不見火 枳殼炒四細末煉蜜同水煎木香和捣 杯緩服之吐止痢亦止 黄切片蜜白芍藥炒六两 大黃九痢初起此實者可用 治喋口痢吐不納藥者 先醒虧廣筆記 甘草酸三檳榔四 胃 弱者禁 苑

**刺吸粥再刺腹中響一泄痢即止今年九十餘尚健也** 授之祭至一兩諸子駭甚再問予予曰遲則不救矣 中之索方者一一神驗黃聚川年兄太夫人年八十 陳赤石督學因校士過勞感暑逐滯下純血醫皆難之 偶患痢貿膈脹絕粒数日予以升麻人參黃連蓮內方 另用人参九補之 予家夏秋患此甚衆輒依前方療之歳為常并以應里 元氟虚者以人参湯吞 苯 孕婦以人參縮砂湯五行後 餘

している こんこう 思食仲淳偶至巫以人奏或石蓮子白芍藥升麻楠 姚公遠切子病痢一醫誤下之遂下純血氣喘引熱不 抵抵不能閱卷奈何仲淳曰此勞心太 遇暑因客之故 爾加竹葉乾葛酸棗仁一劑逐平 蓮肉如 煎調滑石末城二劑而愈督學曰痢止矣心 分矣甘草一發鳥梅仁红麴一分川黃連錢白芍藥兵七矣十 陳刺史曰此非繆仲淳莫能療也使者旁午得之吳門 日夜馳至武林仲淳診得其所由遂用人參與升麻 先醒齊廣筆記 8+4

金万匹尼人言 家弟稚端切病痢甚日夜數十次服數劑即愈 生以下多元氣未復故也未幾即疽果殤 又數劑痢止仲淳臨別囑公遠曰兒百日內不出痘則 紅草石蠶白稿豆滑石末炙甘草投以一劑喘平血止 人参我具來竟派一哉 川黃連蓋汁炒後二味飯鍋 一茲水煎至八分温服如不受以藥一匙問米湯 會乾葛英別調六一散四錢冷水服 漸飲之胃氣漸復如頭痛發熱前方中加寒水石或 匙

友人虞元静房中人方孕五月患滯下腹痛日不下 参级炒黄連 白藊豆 升麻 紅 不以藥試之服如金九因思飲予固守仲淳前方以人 数十聲不絕吳醫争欲下之且曰補即死矣時仲淳以 庚子秋華氏妹歸寧忽痢日夜幾百行身熱發嘔一 服 王母病留湖濱憐其促治後事甚亟曰既已知危何 再進如金九二劑勢稍定更數服愈華水部至今 滑石 炙甘草 嗢 楯

たいりらくいち

先配虧廣筆記

艺

肉 金少世是人 次為定此方甫服 己滯下全愈 黄連殿白芍 花濕拌 枚-段 銀藤即忍敢兩煎濃汁三大碗入地榆五川黃連 枳殼錢紅麴錢草葛 治毒痢及發疹時疹毒下利方 黃檗 黄本 我白芍藥 西姓炙甘草 我升 藥等黄本我白祸且我運內松+ 鍾覺藥行至腹即解 巷 · 錢升麻分炙甘草上 次痛亦隨 橘紅

醫亦以濕熱治之而轉劇仲淳曰投何藥曰蒼术黃連 服 たとりを とう 途次無藥病偶自止歸家腹痛不已徧嘗諸醫之藥藥 口痛愈甚亦不思食仲淳视之曰此濕熱爾其父 色者醋 少年貴介暑月出外飲食失宜兼以暑熱遂患滯 朴枳殼陳皮等仲淳曰誤也木性溫而燥善閉氣故 治濕熱腹痛 同煎至一碗調水雅過滑石末五錢不拘時 先雅南廣筆記 四九

金人也是全言 攻肢體骨節問以致項強目赤肩骨脫膝足腔俱發腫 秦公蕃病痢醫誤投溢劑一服痢止濕熱無自而出過 业 炒黑乾薑分水煎調滑石末服之須臾小便如注痛立 為細末以牡丹皮汁煮之別以白芍藥五銭炙甘草品 滯下家忌之郎君陰虚人也尤非所宜更以滑石一 痛甚不能轉側仲淳疏方寄之用白芍藥石斛牛膝木 **黄檗薏苡仁炙甘草車前子茯苓痛雖止尚不能轉** 巷 兩

滑 溢大肠者肺之腑也大肠既有濕熱留滯則肺家亦必 有可溢之道故古人有間用罌粟殼及訶利勒以止其 凡治滯下與大腸滑泄自利不止不同滑泄自利不止 火又加濕熱暑濕交攻故現此證名痢風陰虚火多故 其始病時一醫稍投參术痛極欲死此係本證陰虚有 不受補又不宜燥惟微寒清平之劑調之久之自愈 八元日四四一人上十百 泄若夫滯下本屬濕熱浩滯不行法宜疏利樂忌兜 先醒虧廣筆記 

側更用蒺藜前花何首烏胡麻黄檗炙甘草復通年愈

上干乎肺則脹悶氣逆不得眠不思食諸證至矣 熱無所宣洩肺氣不得下行非惟帶下增劇濕熱重蒸 云通肺氣其意聚可見已倘誤用器栗殼訶利勒使濕 道下於膀胱是肺氣喜通利惡閉溢故古人藥性中每 有熱肺乃華蓋之藏經曰脾氣散精上歸於肺通調 若兼祭术半夏即死不旋踵矣世醫往往蹈此覆轍 有人嗽不愈緣於肺虚有火法當清肺潤肺忌用澁緣 閉氣之藥設若誤用栗殺訶子俾火壅於肺不得下降

えこりき とう **木秋初沿門闔境患此其盜大都發熱頭疼口渴煩躁** 世醫妄指為漏底殊不知此是時氣使然因世人禀賦 下痢消清甚者一日夜行百次或兼發斑疹勢甚危迫 外有時行疫痢一證三十年前間或有之今則往往夏 消息可謂詳且盡矣然不盡用方書所載投之賴效百 **彝卒無悟者聊為論著敢告方來** 不爽一蓋獨開門户者也 )上瘧痢二門諸方皆仲淳斟酌所定因證加減與時 先雅齊廣筆記 五

如升麻為根柴胡黃連黃本之類或熱甚渴甚前藥中 漸薄積感濕蒸厲氣所致治法當清熱解毒表散為急 可加寒水石更有別證以意加減切忌下行破氣收濇 大黄芒硝檳榔松實鳥梅栗殼等犯此者多致不敢 先醒齊廣筆記卷一